

aco⁺ Info

Accompagner, Comprendre, Optimiser
la prise en charge des patients sous anticoagulant

Comprendre sa phlébite ou son embolie pulmonaire

pour mieux vivre au quotidien



Bristol Myers Squibb®



MES INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom :

.....

Téléphone en cas d'urgence :

SOMMAIRE

• Introduction	5
• Mes informations personnelles	6
• Mes professionnels de santé	6
• La phlébite et l'embolie pulmonaire	8
• La phlébite et l'embolie pulmonaire ne concernent-elles que moi ?	9
• Qu'est-ce que la phlébite ?	10
• Quels sont les symptômes ?	11
• Pourquoi ai-je une phlébite ?	12
• Comment diagnostiquer une phlébite ?	14
• Le risque d'embolie pulmonaire	15
• Reconnaître les symptômes d'une embolie pulmonaire ?	16
• Quelles sont les conséquences d'une embolie pulmonaire ?	17
• La prise en charge de la phlébite	17
• Bien gérer son traitement anticoagulant	18

SOMMAIRE

• Bien vivre avec son traitement anticoagulant	21
- J'ai peur d'avoir des effets indésirables	21
- Parfois j'oublie de prendre mon traitement	22
- Adaptez votre alimentation	23
- Suis-je en surpoids ?	24
- Faites de l'activité physique	25
- Être actif	26
- Adoptez quelques règles de vie au quotidien	28
- Arrêtez le tabac	29
- Les voyages	30
• Quiz : Avez-vous bien compris ?	31
• Mots croisés : êtes vous désormais expert ?	33
• Réponses au Quiz	34
• Réponses aux mots croisés	35
• Bibliographie	36
• Mes rendez-vous médicaux	37
• Suivi de mes effets indésirables	40
• Notes	42

Introduction

- Le traitement de votre maladie nécessite la prise d'un anticoagulant. Il vous a été prescrit pour une durée ponctuelle ou plus prolongée dans le temps. Certaines notions concernant votre traitement sont importantes à connaître et à respecter.
- Les anticoagulants sont des médicaments largement utilisés depuis de nombreuses années. Ils sont indispensables dans le traitement de plusieurs maladies. Les anticoagulants ont en effet pour objectif de fluidifier le sang : utilisés de manière préventive ils vont empêcher la formation de caillots, appelés également thrombus. Ils peuvent également être prescrits en traitement curatif afin d'empêcher l'extension d'un caillot déjà formé, voire de favoriser sa réduction de taille.
- Il existe différents anticoagulants. Votre médecin a déterminé celui qui vous était le plus adapté. Dans tous les cas, un suivi médical régulier et attentif est nécessaire pour assurer l'efficacité de votre traitement. Il est donc primordial de bien suivre la prescription de votre médecin. Respectez la dose qui vous a été prescrite, et le rythme de prise. N'arrêtez ou ne modifiez jamais votre traitement de vous-même : cela vous exposerait à des risques de complications.
- Les saignements sont le principal risque de tout traitement anticoagulant. Ils peuvent être visibles ou non et doivent vous alerter : si l'un de ces signes se manifeste, contactez votre médecin afin de l'informer et de décider avec lui de la marche à suivre. En prévention, au quotidien, tâchez de limiter les situations pouvant entraîner une coupure ou un traumatisme.
- Enfin, n'oubliez pas d'informer tout professionnel de santé que vous êtes sous traitement anticoagulant ; et ne prenez jamais un autre médicament sans interroger votre médecin ou votre pharmacien afin d'éviter des associations médicamenteuses non recommandées.

MES PROFESSIONNELS DE SANTÉ



MON MÉDECIN TRAITANT

Nom :

Téléphone :



MON MÉDECIN VASCULAIRE

Nom :

Téléphone :



MON CARDIOLOGUE

Nom :

Téléphone :



MON INFIRMIÈRE LIBÉRALE

Nom :

Téléphone :

MES PROFESSIONNELS DE SANTÉ



MES MÉDECINS SPÉCIALISTES RÉFÉRENTS

Nom :

Téléphone :

Nom :

Téléphone :

Nom :

Téléphone :

Vous pouvez répertorier vos rendez-vous dans le tableau page 37.

Collez-moi sur la carte vitale

La phlébite et l'embolie pulmonaire

LA PHLÉBITE ET L'EMBOLIE PULMONAIRE



Sont des **troubles cardiovasculaires**¹



Correspondent à la formation d'un caillot de sang dans une veine¹



Peuvent récidiver^{1,2}

La phlébite et l'embolie pulmonaire ne concernent-elles que moi ?

LA PHLÉBITE ET L'EMBOLIE PULMONAIRE



Concernent 50 000 à 100 000 cas par an^{1,3}




Leur fréquence augmente avec l'âge^{1,2}

Qu'est-ce que la Phlébite ? ³

La phlébite correspond à la formation d'un caillot de sang au niveau d'une veine. Elle survient souvent au niveau du mollet et conduit au blocage total ou partiel de la circulation sanguine.

Si le caillot se forme dans une veine superficielle, on parle de phlébite superficielle, également appelée paraphlébite. On parle de phlébite profonde quand le caillot se forme au sein d'une veine profonde, de plus gros calibre.



Quels sont les symptômes ? ⁴

En cas de phlébite, **3 symptômes** doivent vous alerter et vous conduire à consulter au plus vite votre médecin :



LA DOULEUR

Au niveau de la jambe ou du mollet. Elle s'accompagne souvent d'une sensation de lourdeur




L'ŒDÈME

Le mollet est dur et gonflé



LA CHALEUR

La zone concernée est plus chaude au toucher, et peut devenir rouge



Le gonflement, la chaleur et la rougeur dans le mollet indiquent une possible thrombose veineuse profonde

Le saviez-vous ? ^{1,3}

Il est possible de faire une phlébite sans avoir de symptômes très spécifiques.

Pourquoi ai-je une phlébite ? ³

Certaines **situations** ou **facteurs prédisposants** peuvent favoriser la survenue d'une phlébite :

- La stagnation du sang peut favoriser la formation de caillots. C'est le cas par exemple lors :



D'une immobilisation prolongée
(alitement à la suite d'une
opération, port d'un plâtre,...)



D'un long voyage en avion,
en voiture ou en train



De situation de sédentarité
(personnes âgées,
perte de mobilité, ...)



De pathologies gênant
le retour du sang veineux
vers le cœur

Pourquoi ai-je une phlébite ? ³

- La coagulation du sang peut être perturbée et prédispose à la formation de caillots. C'est le cas par exemple lors de :



La prise de certains traitements
(contraception hormonale,
corticoïdes, ...)



Certaines pathologies :
maladies inflammatoires
qui abîment la paroi des veines,
cancers, maladies génétiques



La grossesse



L'obésité



Le tabagisme

Comment diagnostiquer une Phlébite ? ^{1,4}



La consultation avec votre médecin :

Votre médecin vous examine et va rechercher l'existence d'antécédents familiaux et personnels de phlébite.



Les examens :

Une prise de sang (dosage du constituant principal du caillot sanguin) pour valider ou éliminer le diagnostic de phlébite.



Un écho-doppler :


Cet examen est une sorte de "radio des veines" qui permet d'observer la circulation du sang, le caillot et de confirmer le diagnostic en cas de résultat positif du dosage sanguin.

Le saviez-vous ? ¹

- Le risque de récurrence d'une phlébite est de 10 % à 30 % dans l'année qui suit, selon l'âge du patient. En cas de phlébite profonde, tant que le caillot persiste, la phlébite peut se compliquer. Une complication sérieuse est l'embolie pulmonaire (EP).

Le risque d'embolie pulmonaire ⁵

L'embolie pulmonaire correspond à l'obstruction partielle ou totale d'une artère des poumons par un caillot de sang.



Reconnaître les symptômes d'une embolie pulmonaire ⁵

Si une embolie pulmonaire survient, il est important de réagir rapidement pour qu'elle soit prise en charge le plus tôt possible. Savoir reconnaître les symptômes est donc primordial.



SI VOUS OU L'UN DE VOS PROCHES PRÉSENTE
SOUDAINEMENT LES SYMPTÔMES SUIVANTS,
APPELEZ IMMÉDIATEMENT LE 15 OU LE 112
(N° D'URGENCE EUROPÉEN)

Il ne faut pas marcher car cela risque de favoriser la migration du caillot et donc d'aggraver la situation. Ne vous rendez pas seul à l'hôpital ou chez le médecin, la position allongée pour le transport est impérative.



**Douleur thoracique
(dans la poitrine)**

D'un côté,
qui augmente
quand on inspire



**Difficultés
à respirer**

Respiration rapide
et courte, sensation
d'essoufflement



**Toux et crachats
contenant du sang**

Ces signes peuvent être associés dans certains cas à un malaise, une accélération du rythme cardiaque, des extrémités bleues (doigts, lèvres), des signes d'état de choc.

Quelles sont les conséquences d'une embolie pulmonaire ? ⁵

Le caillot obstruant l'artère pulmonaire va provoquer des dommages au niveau du poumon atteint, l'empêchant ainsi de fournir l'oxygène à l'organisme.

La prise en charge de la phlébite ^{1,6,7}

Le traitement d'une phlébite profonde est urgent. Il a pour objectif :

- D'éviter l'augmentation de la taille du caillot
- D'éviter que le caillot ne se détache et passe dans la circulation générale
- Et à plus long terme, de prévenir les récides



La contention élastique ou compression médicale :

Ce sont des chaussettes, bas ou collants spécifiques, à porter de manière continue ou dans certaines situations seulement (voyages en avion par exemple). Cela permet de diminuer les symptômes et de limiter les risques de complications.



Les anticoagulants, pour fluidifier le sang et prévenir la formation de caillots :

Ils peuvent se présenter sous forme d'injections sous-cutanées ou de comprimés à prendre par voie orale. La durée du traitement sera déterminée par votre médecin, selon votre situation. Ce traitement est important mais nécessite une vigilance particulière.

Bien gérer son traitement anticoagulant ⁸

- Au quotidien, pour prévenir les incidents hémorragiques :



Éviter les sports dangereux
(risque de chute ou de traumatisme)



Soyez prudent si vous manipulez des objets tranchants
(couteau de cuisine, outil de jardinage)



Éviter la prise de certains médicaments courants comme
l'aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS),
sauf s'ils vous ont été prescrits par votre médecin



Bien gérer son traitement anticoagulant ⁸

- Consultez **votre médecin** ou **votre pharmacien** avant toute prise
d'un autre médicament : en effet, certains médicaments sont
contre-indiqués avec votre anticoagulant, d'autres peuvent
interagir avec, c'est-à-dire modifier son action.

- **Signalez** à tout professionnel de santé que vous prenez un traitement
anticoagulant.

- Soyez **observant** :



Respectez les doses prescrites par votre médecin,
au rythme prescrit



N'arrêtez pas ou ne modifiez pas votre traitement
sans l'accord préalable de votre médecin



En cas d'oubli de prise, reportez-vous à la notice
de votre médicament ou contactez votre médecin

Bien gérer son traitement anticoagulant⁸

Vous prenez un anticoagulant dans le cadre de votre thrombose veineuse profonde ? Voici quelques informations à connaître concernant votre traitement.

En diminuant la coagulation du sang, l'anticoagulant peut être associé à des saignements. En cas de crainte de toutes hémorragies/saignements, prenez rendez-vous avec votre médecin :

- Sachez reconnaître les signes évocateurs d'un surdosage (responsable d'un saignement ou d'une hémorragie) ; ils peuvent être visibles ou non et doivent vous conduire à consulter votre médecin.



Signes de saignements visibles

Saignement des gencives, saignement du nez ou œil rouge (hémorragie conjonctivale), apparition de bleus (ecchymoses, hématomes), présence de sang dans les urines, règles anormalement abondantes, présence de sang rouge dans les selles ou selles noires, vomissement ou crachats sanglants, saignements qui ne s'arrêtent pas.



Signes de saignements internes non-visibles


Fatigue inhabituelle, essoufflement anormal, pâleur inattendue, mal de tête ne cédant pas au traitement, malaise.

Bien vivre avec son traitement anticoagulant

J'AI PEUR D'AVOIR DES EFFETS INDÉSIRABLES^{8,9}

Les effets indésirables avec les anticoagulants sont fréquents : informez-vous auprès d'un professionnel de santé.

Vous pouvez répertorier vos effets indésirables dans le tableau page 40.



- Saignement des gencives,
- Saignement du nez,
- Œil rouge,
- Apparition de bleus,
- Sang dans les urines,
- Règles anormalement abondantes,
- Sang dans les selles ou selles noires,
- Vomissement ou crachats sanglants,
- Saignements qui ne s'arrêtent pas,
- ...

Bien vivre avec son traitement anticoagulant⁹

Bien comprendre les enjeux de votre traitement est **primordial** !

Soyez acteur de votre prise en charge et ne perdez pas de vue l'objectif de votre traitement. Pour cela, n'hésitez pas à poser des questions à votre médecin ou à votre pharmacien sur :

- Votre pathologie
- Les enjeux et les bénéfices de votre traitement
- Les caractéristiques de vos médicaments

Respectez bien le rythme des consultations, prises de sang éventuelles et examens.

PARFOIS J'OUBLIE DE PRENDRE MON TRAITEMENT...⁹

Bien suivre son traitement est un facteur clé pour la réussite de votre prise en charge.

Adopter quelques astuces peut vous aider à limiter les oublis :

- Adaptez si possible l'horaire de prise à votre emploi du temps
- Associez la prise de votre médicament à une "routine" quotidienne
- Mettez une alarme sur votre téléphone, pour vous rappeler l'heure de la prise de votre médicament.

Bien vivre avec son traitement anticoagulant


ADAPTEZ VOTRE ALIMENTATION !¹⁰

Une alimentation trop riche et trop sucrée peut favoriser la survenue de facteurs néfastes pour le cœur (tels que le diabète, l'excès de cholestérol...). Si vous êtes en surpoids, il est recommandé de réduire votre surcharge pondérale car cela aggrave le risque de pathologies cardiovasculaires et a un impact négatif sur le retour veineux.

Pour adopter un **régime sain et équilibré**, privilégiez les aliments les moins gras, les moins salés, et la variété : au moins 5 fruits et légumes par jour, des féculents notamment les aliments au blé complet, les produits laitiers, variez les sources de protéines et buvez de l'eau à volonté.

Limitez les graisses, les aliments gras et sucrés à la fois, les boissons sucrées, le sel, les plats industriels et les boissons alcoolisées.

Limitez les aliments qui favorisent la congestion des veines : alcool, épices, café, thé.



Bien vivre avec son traitement anticoagulant

SUIS-JE EN SURPOIDS ? ¹¹⁻¹³

x2 Le risque de MTEV d'un patient obèse est **2 À 2,5 FOIS**
à **x2,5** **SUPÉRIEUR** à celui des patients de poids normal
et augmente proportionnellement avec l'IMC. ¹¹

L'IMC (indice de masse corporelle) est une valeur permettant d'évaluer la corpulence d'une personne. Elle tient compte de la taille et du poids.

CALCULEZ VOTRE IMC :

Pour calculer votre IMC :

$IMC = \text{Poids (en kilogrammes)} \div \text{Taille}^2 \text{ (en mètre)}$

Par exemple : je pèse 80 kg et mesure 1,70 m, mon IMC est 27,6 ($80 \div 1,7^2$)

Poids (en kg)

÷

Taille² (en mètre)

=

Résultat
de votre IMC

IMC < 18,5

Maigreux

25 ≤ IMC < 30

Surpoids

18,5 ≤ IMC < 25

Corpulence
normale

IMC ≥ 30

Obésité

Bien vivre avec son traitement anticoagulant

FAITES DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ! ¹⁰

La marche est importante pour favoriser une bonne circulation sanguine :

- Marchez un peu tous les jours (30 minutes au moins 3 fois par semaine) : faites les petites courses et les petits trajets à pied plutôt qu'en voiture ou en transport, préférez les escaliers à l'ascenseur, faites des ballades durant vos loisirs,...

Pratiquez un sport qui favorise le retour veineux en faisant travailler le mollet :

- Natation, gymnastique, danse, vélo,...

Faites régulièrement des petits exercices (pédalage,...) et des automassages des jambes (en remontant des chevilles vers les genoux)

Le saviez-vous ? ¹⁴

Certains sports sont déconseillés en cas de problèmes veineux et/ou si vous êtes sous anticoagulants (sports violents pouvant engendrer des blessures, sports pouvant bloquer la circulation du sang ou provoquant des "à-coups" néfastes pour les veines) : Parlez-en avec votre médecin.

Bien vivre avec son traitement anticoagulant

ÊTRE ACTIF !¹⁴

i À savoir



Pratiquer une activité physique régulière est bénéfique pour votre santé en général



En cas de phlébite, la marche est importante : 30 minutes au moins 3 fois par semaine



Certains sports sont particulièrement bénéfiques pour favoriser le retour veineux (natation, vélo,...)

ÉVALUEZ-VOUS

Marchez vous tous les jours ? ☐ OUI ☐ NON

Combien de temps marchez-vous par jour (balades, trajets quotidiens, courses,...) ?

.....

Quelles activités vous motivent particulièrement (danse, vélo, gym,...) ?

.....

.....

Bien vivre avec son traitement anticoagulant

ÊTRE ACTIF !¹⁴


VOS OBJECTIFS FIXÉS AVEC VOTRE MÉDECIN

Ex : Je marche au moins 30 minutes par jour, je vais à la piscine 2 fois par semaine...


.....

.....

Quelques exercices simples, ainsi que l'automassage, peuvent être bénéfiques pour une meilleure circulation sanguine :



©CNAMTS2011



©CNAMTS 2011

Bien vivre avec son traitement anticoagulant

ADOPTÉZ QUELQUES RÈGLES DE VIE AU QUOTIDIEN ¹⁴

En cas de phlébite, il est important d'adopter quelques règles au quotidien pour limiter le risque de récurrence. Il faut notamment favoriser une bonne circulation du sang au niveau des jambes, c'est ce que l'on appelle "le retour veineux", pour empêcher la formation de caillots.

Vous pouvez par exemple :

- Porter des chaussures confortables à petit talon (3 cm),
- Éviter les vêtements qui compriment (vêtements trop serrés, bottes, mi-bas...),
- Éviter d'exposer vos jambes à la chaleur (bains trop chauds, sauna, épilation à la cire chaude...),
- Privilégier les douches d'eau froide,
- Éviter certaines postures afin de laisser vos jambes étendues.

Bien vivre avec son traitement anticoagulant

ARRÊTEZ LE TABAC ! ¹⁵⁻¹⁷

Le tabagisme **AUGMENTE** le risque de phlébite ¹⁷

LE TABAC EST L'ENNEMI DE VOTRE CŒUR ET DE VOS ARTÈRES !

Il augmente le risque de phlébite et d'embolie pulmonaire, en favorisant notamment la formation de caillot dans les vaisseaux sanguins.

COMMENT ARRÊTER ?

- Vous pouvez bien entendu entreprendre cette démarche seul
- Vous pouvez avoir recours si besoin à des substituts nicotiniques: demandez conseil à votre pharmacien
- Être aidé et soutenu peut être primordial pour y arriver
 - Vous pouvez vous faire accompagner par votre médecin traitant ou par un autre professionnel de santé spécialisé comme un tabacologue.
 - Tabac Info service propose un accompagnement téléphonique et un suivi personnalisé dans votre démarche d'arrêt.

Pour plus d'information, connectez-vous sur
tabac-info-service.fr

Bien vivre avec son traitement anticoagulant

LES VOYAGES ¹⁸

Quel que soit le type de voyage : en train, en voiture ou en avion il est recommandé de **faire des mouvements réguliers** des jambes ou de marcher.

Les voyages en avion, notamment les longs vols (plus de 6 heures) peuvent favoriser l'apparition d'une phlébite profonde à cause notamment de la position assise prolongée que l'on adopte.

Si vous prenez l'avion, vous devez donc prendre des précautions particulières :

- Portez des vêtements amples pour voyager, évitez les vêtements serrés
- Portez des chaussettes, bas ou collants de contention
- Ne croisez pas les jambes, et faites régulièrement des mouvements de jambes (flexion-extension...)
- Ne restez pas assis tout le voyage : levez-vous et marchez régulièrement dans le couloir de l'avion
- Évitez de prendre des somnifères, pour ne pas tomber dans un sommeil lourd et rester immobile pendant plusieurs heures
- Buvez régulièrement et abondamment car la pressurisation de la cabine entraîne une déshydratation

Quiz : Avez-vous bien compris ?

1

La phlébite apparaît le plus souvent

(Une seule réponse possible)

A

Au niveau du molet

B

Au niveau du bras

C

Au niveau de la cuisse

D

Au niveau de la poitrine

2

Quels sont les 3 symptômes typiquement associés à la phlébite

A

La douleur

B

L'œdème

C

Les démangeaisons

D

La chaleur

VRAI OU FAUX

3

L'embolie pulmonaire est toujours une urgence

A

Vrai

B

Faux

4

Si je présente les signes d'une embolie pulmonaire, je peux me rendre à pied à l'hôpital ou chez mon médecin

A

Vrai

B

Faux

QUELLE EST L'AFFIRMATION EXACTE ?

5

En cas de phlébite profonde le traitement anticoagulant a pour objectif

A

De détruire le caillot

B

D'éviter l'augmentation de la taille du caillot

C

De réduire l'œdème

D

De réduire l'inflammation

Quiz : Avez-vous bien compris ?

6

Parmi les signes suivants, lesquels sont évocateurs d'un surdosage d'anticoagulant
(plusieurs réponses sont possibles)

- A** La présence de sang dans les urines **B** Un fatigue inhabituelle
C L'apparition de bleus sur le corps **D** Un essoufflement

VRAI OU FAUX

7

La marche est importante pour favoriser une bonne circulation du sang au niveau des jambes

- A** Vrai **B** Faux

8

Le surpoids est un facteur favorisant la phlébite


- A** Vrai **B** Faux

9

Si j'ai une phlébite profonde, je ne peux plus prendre l'avion

- A** Vrai **B** Faux

Mots croisés : êtes-vous désormais expert ?



Horizontal

- 3.** Traitement qui fluidifie le sang
4. Le respect par le patient des prescriptions et des posologies
5. Indice permettant d'évaluer la corpulence d'une personne
6. La prise en charge de la phlébite comporte l'anticoagulation et la...
8. Synonyme de "bleu", par exemple : quand on se cogne
9. Le mot qui signifie "la formation d'un caillot de sang au niveau d'une veine"
10. Quand l'indice de masse corporelle est compris entre 25 et 30

Vertical

- 1.** Mauvaise habitude qui favorise et augmente le risque de phlébite et d'embolie pulmonaire
2. Le risque principal lié aux anticoagulants
7. La "radio des veines" qui permet d'observer la circulation du sang

Réponses au Quiz

1. **Réponse A :** Le caillot, responsable de la phlébite, peut se former dans presque toutes les veines de l'organisme mais survient le plus souvent au niveau du mollet^{1,3}.
2. **Réponses A, B et D :** Ces 3 symptômes : douleur, œdème et chaleur, sont évocateurs d'une phlébite, et doivent vous alerter et vous conduire à consulter votre médecin⁴.
3. **Vrai :** Si une embolie pulmonaire survient, il est important de réagir rapidement pour qu'elle soit prise en charge le plus tôt possible. En effet l'oxygénation de l'organisme est altérée, le caillot bloquant la circulation sanguine au niveau du poumon⁵.
4. **Faux :** Il ne faut pas marcher car cela risque de favoriser la migration du caillot et donc d'aggraver la situation : la position allongée pour le transport est impérative. Appelez immédiatement le 15 ou le 112 (n° d'urgence européen)⁵.
5. **Réponse B :** En cas de phlébite profonde, différents traitements anticoagulants peuvent être utilisés : ils ne détruisent pas le caillot mais visent à éviter qu'il grossisse en empêchant les mécanismes de coagulation⁶.
6. **Réponses A, B, C et D :** Tous ces symptômes sont des signes évocateurs d'un saignement donc d'un surdosage. Contactez votre médecin si vous présentez l'un de ces signes⁸.
7. **Vrai :** La marche est importante pour favoriser une bonne circulation sanguine. Marchez au moins 30 minutes 3 fois par semaine. Pratiquez également un sport qui favorise le retour veineux en faisant travailler le mollet (danse, vélo, natation...) ¹⁰.

Réponses au Quiz

8. **Vrai :** Le risque de MTEV d'un patient obèse est 2 à 2,5 fois supérieur à celui des patients de poids normal et augmente proportionnellement avec l'IMC¹¹.
9. **Faux :** Vous pouvez voyager en avion. Cependant les voyages en avion (notamment les longs vols de plus de 6 heures) peuvent favoriser l'apparition d'une phlébite profonde : il faut donc suivre quelques recommandations particulières. Reportez-vous à la rubrique "Mes voyages"¹⁸.

Réponses aux mots croisés

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Tabagisme | 6. Contention |
| 2. Saignement | 7. Echo-doppler |
| 3. Anticoagulant | 8. Hématome |
| 4. Observance | 9. Phlébite |
| 5. IMC | 10. Surpoids |

Bibliographie

1. Inserm. (page consultée le 26/02/25). Thrombose veineuse (Phlébite), [en ligne]. <https://www.inserm.fr/dossier/thrombose-veineuse-phlebite/>.
2. Bura-Rivière A. Maladie thromboembolique veineuse. Le concours médical. 136. n°6. Juin 2014.
3. Ameli.fr. (page consultée le 26/02/25). Phlébite : définition et facteurs favorisants, [en ligne]. <https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/phlebite/definition-facteurs-favorisants>.
4. Ameli.fr. (page consultée le 26/02/25). Phlébite : symptômes et diagnostic, [en ligne]. <https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/phlebite/symptomes-diagnostic-evolution>.
5. Ameli.fr. (page consultée le 26/02/25). Embolie pulmonaire, [en ligne]. <https://www.ameli.fr/assure/sante/urgence/pathologies/embolie-pulmonaire>.
6. Ameli.fr. (page consultée le 26/02/25). Le traitement de la phlébite, [en ligne]. <https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/phlebite/traitement>.
7. Sanchez O, et al. Recommandations de bonne pratique pour la prise en charge de la maladie veineuse thromboembolique chez l'adulte. Version courte. *Rev Mal Respir*. 2019;36(2):249-283.
8. ANSM. Carnet de suivi et d'information. Vous et votre nouveau traitement anticoagulant.
9. IMS Health et CRIP. Améliorer l'observance : Traiter mieux et moins cher.
10. Ameli.fr. (page consultée le 26/02/25). Comment réduire son risque cardiovasculaire ?, [en ligne]. <https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/risque-cardiovasculaire/reduire-risque-cardiovasculaire>.
11. Planquette B, et al. Prévention de la thrombose veineuse chez les patients obèses en réanimation. *Réanimation* (2015) 24:46-55.
12. Blokhin IO et Lentz SR. Mechanisms of thrombosis in obesity. *Curr Opin Hematol*. 2013;20(5):437-44.
13. Inserm. Obésité - une maladie des tissus adipeux. 2019.
14. Ameli.fr. (page consultée le 26/02/25). Préserver le capital veineux de ses jambes, [en ligne]. <https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/sante/themes/varices-jambes/preserver-capital-veineux-jambes>.
15. INPES. J'arrête de fumer : Le guide pratique pour y parvenir.
16. Tabac-infor-service.fr. (page consultée le 26/02/25). Je fais le point sur ma confiance, [en ligne]. <https://www.tabac-info-service.fr/j-arrete-de-fumer/je-fais-le-point-sur-ma-confiance>.
17. Fédération Française de Cardiologie (page consultée le 26/02/25). Les méfaits du tabac sur le cœur et les vaisseaux, [en ligne]. <https://www.fedecardio.org/je-m-informe/les-mefaits-du-tabac-sur-le-coeur-et-les-vaisseaux/>.
18. Ameli.fr. (page consultée le 26/02/25). Prévenir la phlébite, [en ligne]. <https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/phlebite/prevention>

MES RENDEZ-VOUS MÉDICAUX

Au cours de votre suivi, vous serez amené(e) à consulter régulièrement plusieurs membres de votre équipe soignante.

Dans cette partie, vous pouvez noter vos rendez-vous médicaux :

Date et heure	Professionnel de santé ou examen	Remarques
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		

MES RENDEZ-VOUS MÉDICAUX

Au cours de votre suivi, vous serez amené(e) à consulter régulièrement plusieurs membres de votre équipe soignante.

Dans cette partie, vous pouvez noter vos rendez-vous médicaux :

Date et heure	Professionnel de santé ou examen	Remarques
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		

MES RENDEZ-VOUS MÉDICAUX

Au cours de votre suivi, vous serez amené(e) à consulter régulièrement plusieurs membres de votre équipe soignante.

Dans cette partie, vous pouvez noter vos rendez-vous médicaux :

Date et heure	Professionnel de santé ou examen	Remarques
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		
...../...../.....h.....		

SUIVI DE MES EFFETS INDÉSIRABLES

Type d'effet indésirable	Date de survenue	Intensité perçue (Placez une croix sur la règle pour indiquer l'importance du symptôme)
	/...../.....	Absence de symptômes Symptômes très intenses
	/...../.....	Absence de symptômes Symptômes très intenses
	/...../.....	Absence de symptômes Symptômes très intenses
	/...../.....	Absence de symptômes Symptômes très intenses
	/...../.....	Absence de symptômes Symptômes très intenses
	/...../.....	Absence de symptômes Symptômes très intenses
	/...../.....	Absence de symptômes Symptômes très intenses
	/...../.....	Absence de symptômes Symptômes très intenses

SUIVI DE MES EFFETS INDÉSIRABLES

Type d'effet indésirable	Date de survenue	Intensité perçue (Placez une croix sur la règle pour indiquer l'importance du symptôme)
	/...../.....	Absence de symptômes Symptômes très intenses
	/...../.....	Absence de symptômes Symptômes très intenses
	/...../.....	Absence de symptômes Symptômes très intenses
	/...../.....	Absence de symptômes Symptômes très intenses
	/...../.....	Absence de symptômes Symptômes très intenses
	/...../.....	Absence de symptômes Symptômes très intenses
	/...../.....	Absence de symptômes Symptômes très intenses
	/...../.....	Absence de symptômes Symptômes très intenses

Notes

[illegible]

Notes

[illegible]

aco⁺ Info

Accompagner, Comprendre, Optimiser
la prise en charge des patients sous anticoagulant



acoplus.fr

Pour en savoir plus sur votre maladie
contactez votre médecin ou
rendez-vous sur **acoplus.fr**

Vous êtes suivi pour une
fibrillation atriale ?

Vous êtes suivi pour
une **phlébite** ?



VOUS INFORMER

sur votre pathologie
et votre traitement



VOUS APPORTER

des conseils pratiques
et des témoignages
d'autres patients



VOUS ACCOMPAGNER

dans votre suivi
quotidien avec
votre médecin



 Bristol Myers Squibb®



CV-FR-2500041-NP-Février 2025 - PP-UNP-FRA-4373

Pfizer, Société par actions simplifiée au capital de 47.570 €. Siège social : 23-25 avenue du Docteur Lannelongue - 75014 Paris - 433 623 550 RCS Paris - SIREN 433 623 550 - SIRET 433 623 550 00020 - N° TVA Intra-communautaire FR 73 433 623 550. Locataire-gérant de Pfizer Holding France. © Tous droits réservés. Bristol Myers Squibb, Société par actions simplifiée - Siège social : 3, rue Joseph Monier - 92500 Rueil-Malmaison - RCS 562 011 742 Nanterre. Capital social : 86.013.674,01 euros. bms.com/fr - Tél. : (33) 1 58 83 60 00 - Fax : (33) 1 58 83 60 01. © Tous droits réservés.

